



AI-mix

Acaricida / Insecticida Orgánico



FICHA TÉCNICA

1. Distribuidor

AGROPLANET MÉXICO
Culiacán, Sinaloa.
www.agroplanetmexico.mx
Tel. +52 66 7183 4231

2. Contenido

INGREDIENTES	% p/p
Extracto oleoso de ajo	30 %
Extracto oleoso de canela	30 %
Surfactantes	40 %
TOTAL	100 %

3. Características

- Acaricida/insecticida botánico elaborado con bioactivos solubles en aceite provenientes del ajo y la canela.
- Actuá al contacto con las plagas afectando sistema nervioso y la estructura externa del cuerpo de los insectos y ácaros.
- Puede ser integrado al manejo de diferente tipos de plagas incorporando una herramienta eficaz tanto para el control de los insectos y ácaros como para la disminución en la aplicación de productos químicos y la aparición de individuos resistentes a ellos.

4. Preparación del producto

Antes de abrir el envase es sumamente importante que el producto sea agitado vigorosamente, la fórmula es bifásica por lo que se debe emulsificar por agitación los líquidos. Retire la tapa y el sello antiderrames y vierta el contenido en un recipiente medidor o en agua para la aplicación. Agite continuamente hasta lograr la disolución del producto en el agua. Enjuague muy bien los instrumentos utilizados en la aplicación antes de guardarlos o usarlos para otras aplicaciones.

El agua debe tener un pH entre 5.5 y 7.0 y estar libre de arcillas disueltas visibles.

5. Recomendaciones de uso.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cc/L	INTERVALO
Calabacita, Lechugas, Pimientos, Tomates, Coliflor, Brócoli, Espinaca, Acelga, Albahaca, Habas, Maíz, Alcachofas, Apio, Pepinos. Espárrago.	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>) Pulgón (<i>Myzus Persicae</i>)	7.5 -10	Cada 5 a 7 días
Berries: Frutillas, Frambuesas, Arándanos, Zarzamora, Moras.	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	7.5 -10	Cada 5 a 7 días
Frutales: Manzanos, Perales, Cerezos, Ciruelos, Duraznos, Aguacate, Citricos, Almendros, Nogales, Olivos, Papayos, Uva mesa, Uva vinífera.	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	7.5 -10	Cada 5 a 7 días

* Reingreso inmediato a áreas tratadas.

* Cero días al corte.

- No es necesario usar dispersantes o penetrantes para la aplicación de AI-MIX.
- Los monitoreos pueden realizarse después de 2 horas de la aplicación.

6. Contraindicaciones

No aplique el producto en horas de calor intenso.
No aplique el producto con una velocidad del viento superior a 10 Km/Hora.

7. Fitotoxicidad

AI-MIX no representa un riesgo fitotóxico en las dosis señaladas en la tabla de recomendaciones.

8. Incompatibilidad

No haga mezclas del producto con calcio, esto podría aumentar considerablemente la viscosidad de la mezcla. AI-MIX no presenta problemas de incompatibilidad con los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. Para asegurarse de la compatibilidad física, se recomienda hacer una premezcla en un recipiente con la dosis completa y dejarlo en reposo 5 minutos. Si no se presenta una precipitación de los materiales, debe considerarse que dicha mezcla es físicamente compatible.