

INGREDIENTES

Extracto de orégano	35.00% v/v
Extracto de clavo	35.00% v/v
Surfactantes y diluyentes	30.00% p/v
TOTAL	100.00%

CARACTERÍSTICAS

Es un fungicida orgánico de amplio espectro elaborado con bioactivos de control provenientes del clavo y orégano. Su formulación permite que los bioactivos actúen de manera inmediata sobre hongos patógenos que afectan tanto a las raíces de las plantas como a las hojas.

FUNGIMIX también tiene activos naturales que mejoran la resistencia de la planta a los ataques de hongos y bacterias, ayudando así a la rehabilitación de plantas enfermas al mismo tiempo que sanitiza el sustrato.

- Acción translaminar.
- Activo sobre una gran variedad de hongos foliares y radicales.
- Auxiliar para el fortalecimiento de la planta.
- Aplicaciones preventivas y curativas tempranas.
- No avejenta o estresa al cultivo.
- Sin efectos fitotóxicos.

OBSERVACIONES

- Es compatible con la mayoría de los pesticidas, puede ser utilizado en mezcla con productos formulados como polvo seco.
- Cero horas de reingreso.
- No genera resistencia.

PRECAUCIONES

- No almacene el producto bajo el sol.
- Lave con abundante agua en caso de salpicadura o derrame.
- En caso de aplicaciones foliares evite vientos superiores a 10 km/h y la alta radiación solar.

PREPARACIÓN

Agite el producto antes de abrir envase. Retire la tapa y el sello antiderrames y vierta el contenido en un recipiente medidor o en agua para la aplicación. Agite continuamente hasta lograr la disolución del producto en el agua. El agua debe tener un pH entre 5.5 y 7.0 y estar libre de arcillas disueltas visibles.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	APLICACIÓN
Chile, Chile Bel, Jitomate, Tomate de Cáscara, Tabaco, Papa, Berenjena, Melón, Pepino, Sandía, Calabacita, Calabaza, Chayote, Cebolla, Poro, Cebollín, Repollo, Coliflor, Brócoli, Lechuga, Rábano, Pimienta Ornamentales y Viveros.	Fertirriego 3 – 5 litros por hectárea Asperjado 3 – 7 ml /L - En preventivo aplicar 1 vez al mes. - En los primeros síntomas de la enfermedad aplicar cada semana. - En las primeras fases de la enfermedad aplicar cada 3 días.
Girasol, Cártamo, Alfalfa, Haba, Garbanzo, Ejote, Frijol, Chícharo, Maíz, Sorgo, Avena, Centeno, Arroz, Cebada y Caña De Azúcar.	
Aguacate, Cítricos, Frutales.	
Agave, Piña, Esparrago.	
Berries, Fresa.	

CONTROL SOBRE ENFERMEDADES

Enfermedad	Microorganismo	Aplicación	Severidad	Dosis	Frecuencia
Mildiu	Plasmopara sp. Peronospora sp. Phytophthora sp.	Foliar	≤ 5% 5 al 10% 10 al 20%	3 mL/L 5 mL/L 5 mL/L	7 días 5 días 3 días
Oidio	Erysiphe sp.				
Cenicilla	Uncinula sp.				
Roya	Puccinia spp.				
Tizón temprano	Alternaria sp.				
Tizón tardío	Phytophthora infestans				
Botritis	Botrytis sp.				
Antracnosis	Colletotrichum sp.	Riego	Inicial Intermedia	3 L/ha 5 L/ha	7 días 5 días
Marchitamiento Fúngico	Fusarium spp.				
	Phytophthora sp.				
	Botrytis sp.				
	Rhizoctonia sp.				
	Sclerotium spp.				
Complejo Damping off				5 L/ha	5 días

